

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 24 - 7 - 78010885
BULLETIN TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

n° 533. A.D.
ÉDITION DE LA STATION "NORD et PICARDIE"

(NORD - PAS-DE-CALAIS - SOMME - AISNE - OISE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX - B.P. 355 - 62005 ARRAS -
Tel 23.09.35

Rég. recettes Dir. Dép. Agric.

13, Grand-Place - 62022 ARRAS

C.C.P. LILLE 5701-50

ABONNEMENT ANNUEL

BULLETIN n° 129 du 20 Juillet 1978

60 Francs

GRANDES CULTURES

POMME DE TERRE

Mildiou : Comme nous l'envisagions dans notre précédent bulletin du 12 Juillet, la maladie a connu, autour de la mi-juillet, un certain développement. Ce développement est très variable suivant les régions et il est étroitement lié à la qualité même des interventions précédentes : nombre et dates des interventions, pratique soignée de la pulvérisation dans certains cas, choix judicieux des produits, ont joué un rôle déterminant cette année dans le contrôle de l'épidémie.

Là où la protection a pu être bien assurée dès la mi-juin, la situation sanitaire des cultures est satisfaisante et a peu évolué ces derniers jours ; par contre, dans de nombreuses régions, là où la protection a été insuffisante pour diverses raisons, la maladie a évolué sensiblement. Les foyers de mildiou, d'importance variable sont nombreux et virulents et posent de réels problèmes quant à la protection de la récolte ultérieure.

Actuellement, les dernières pluies et ondées orageuses ont créé à nouveau des conditions très favorables aux repiquages à partir des taches et foyers existant en cultures. Une nouvelle progression de la maladie est donc fort probable, en particulier dans les secteurs déjà touchés, exerçant aussi une nouvelle pression sur l'ensemble des cultures normalement protégées.

Assurer une bonne protection de l'ensemble de ces cultures dans les 5 à 6 jours qui suivent toutes conditions d'hygrométrie élevée prolongée, comme indiqué dans nos précédents bulletins, soit pour le 25 Juillet et les jours suivants, compte tenu des dernières pluies.

Comme déjà indiqué également, il peut être opportun d'utiliser dans les tous derniers traitements, au voisinage même du brûlage, comme sur cultures de plants dans l'immédiat des produits cupriques ou organo cupriques pour tenter de limiter la propagation du mildiou sur tubercules.

Il se confirme que l'utilisation du Daconil est justifiée dans les cas difficiles.

Pucerons : On signale dans les Flandres l'arrivée des pucerons sur pousses terminales de pommes de terre de consommation.

.../...

30

ARBORICULTURE FRUITIERE

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Pour le PAS DE CALAIS, des éclosions ont cours actuellement mais elles sont de faible importance. Par contre, à partir du 25, débutera une nouvelle vague d'éclosions, plus importante que les précédentes, qui se poursuivra au moins jusqu'au 5 Août. Tous les vergers régulièrement attaqués devront donc être couverts au cours de cette période.

Pour les secteurs chauds et froids de l'AISE, de l'OISE et de la SOMME, de nouvelles éclosions, les plus importantes jusqu'à présent, vont se produire à partir du 22. Observez soigneusement vos fruits à partir de cette date de manière à intervenir dès que vous constaterez les premières morsures. Nous faisons les mêmes recommandations pour les vergers situés dans les zones urbaines du NORD.

Pour les zones froides du NORD, les prises relativement faibles que nous enregistrons depuis le début du mois de Juillet permettent de penser que les risques de pénétration sont relativement limités. Cependant, observez régulièrement vos fruits et n'intervenez que sur constat.

C. P. P. A. P. n° 533 A. D.

L'INGENIEUR D'AGRONOMIE

D. CALLU